

Checkliste: Bauchdeckenstraffung (Abdominoplastik)

Liebe Patientin, lieber Patient,

Du hast Dich für eine Bauchdeckenstraffung in unserem Hause entschieden. Wir danken Dir für Dein Vertrauen!

Durch starke Gewichtsabnahme, Schwangerschaft oder dem Alterungsprozess an sich, kann es zu einem Hautüberschuss im Bauchbereich kommen. In diesem Fall ist eine Bauchdeckenstraffung indiziert.

Bei einer Bauchdeckenstraffung kann entweder nur Gewebe unterhalb des Bauchnabels entfernt werden (Minibauchdeckenstraffung bzw. kann bei stärkerer Ausprägung auch Gewebe unter- und oberhalb des Bauchnabels entfernt und der Bauchnabel dabei versetzt werden.

Wenn während der Schwangerschaft die Rektusscheide (Bindegewebshülle der geraden Bauchmuskeln) auseinanderweicht, kann diese während einer kompletten Bauchdeckenstraffung gestrafft (Rektusraffung) und so die geraden Bauchmuskeln wieder zusammengeführt werden.

Ist zusätzlich überschüssiges Fettgewebe im Bauch- bzw. Rücken oder Flankenbereich vorhanden, kann dieses während der Operation gleichzeitig entfernt werden.

Die Narben kommen im Bereich des Unterbauches zu liegen und können in der Regel von einem Bikinihöschen oder einer Badehose verdeckt werden. Wird zusätzlich der Bauchnabel versetzt, dann resultiert eine kleine Narbe rund um den Bauchnabel.

Für Deinen Komfort wird die Operation in Vollnarkose durchgeführt. Die Operation findet mit 1-2 Nächten Aufenthalt in der Klinik statt. Wir bitten Dich, einen Heimfahrtendienst zu organisieren. (Privat oder Taxi ist möglich, öffentliche Transportmittel würden wir nach der Operation nicht empfehlen).

Die Narkosefreigabe wird von unserem Narkosearzt erteilt, der Dir gleichzeitig Blut abnimmt und die nötigen Untersuchungen vornimmt. Wir organisieren gerne einen Termin mit unserem Narkosearzt.

Die genauen Kosten werden beim Beratungsgespräch erörtert und sind vom Operationsaufwand abhängig. Ungefähre Preise kannst Du aus unserer Preisliste entnehmen.

Während dem Beratungs-, sowie während des OP-Gesprächs hast Du ausreichend Zeit Fragen zu stellen. Der Aufklärungs- und Einwilligungsbogen wird nach dem Beratungsgespräch mitgegeben und ist zum Operationsgespräch ausgefüllt mitzunehmen. Solltest Du zwischendurch Fragen haben, sind wir jederzeit für Dich unter +43 676

4464776 oder +43 1 353 1449 bzw. per Mail unter ordination@dieschoenheitschirurgin.at erreichbar. Für Fragen stehen wir Dir selbstverständlich gerne jederzeit zur Verfügung!

Wir bitten Dich, nachfolgende Hinweise zu beachten.

Dr. Sabine Apfolterer, MBA

VOR DER BEHANDLUNG

- Bitte komme am Tag der Operation nüchtern in die Klinik. Das heißt, essen ist bis 6 Stunden vor der Operation erlaubt, Wasser darfst Du bis 3 Stunden vor der Operation trinken. Ziehe bequeme Kleidung an, am besten einen Jogginganzug oder ähnliches. Nimm Dir etwas zum Lesen, oder ein wenig Musik zur Überbrückung der Wartezeit mit. Wir ersuchen Dich, ca. 1-2 h vor der geplanten OP in der Klinik zu sein um alle Formalitäten und Voruntersuchungen (Blutdruck messen...) in Ruhe erledigen zu können. Bitte nimm Dir ausreichend Zeit mit, selten kann es durch Voroperationen zu Verzögerungen kommen.
- Du solltest bereits 10 Tage vor Deinem Termin keine blutverdünnenden Medikamente (z.B. Aspirin, Thomapyrin,) einnehmen. Sind die blutverdünnenden Medikamente von Deinem Hausarzt verordnet, kläre bitte im Vorhinein, wie Du die Medikamente pausieren bzw. ersetzen sollst (Marcumar, Plavix ...).
- Wir passen vor der Operation eine Kompressionswäsche nach Deinen Bedürfnissen an. Die Kompressionswäsche bekommst Du von uns nach der Operation angelegt.
- Vor der Operation werden wir noch einmal den Ablauf im Detail besprechen. Es werden Fotos zur Dokumentation angefertigt.
- Falls Du nervös oder aufgeregt bist, verabreichen wir bei Ankunft in der Klinik eine Beruhigungstablette. Gerne können wir auch für den Tag vor der Operation etwas verschreiben.
- Um einen möglichst komplikationslosen Heilungsverlauf zu unterstützen, bitten wir Dich, mindestens 2 Wochen vor bis 2 Wochen nach dem Eingriff nicht zu Rauchen bzw. das Rauchen so weit als möglich zu reduzieren.

WAHREND DER BEHANDLUNG

- Die Operation dauert je nach Aufwand ca. 1,5 - 2,5 Stunden.
- Während der Operation hast Du keine Schmerzen.
- Du bekommst bei der OP zwei Redondrainagen (damit überschüssiges Wundsekret ablaufen kann)
- Die Wunden werden mit Klammern gesichert, darüber kommt ein Pflasterverband und ein Bauchgurt.

NACH DER BEHANDLUNG

- Du wirst keine starken Schmerzen haben, jedoch ist ein leicht, bis mäßig brennender Wundschmerz in den ersten Tagen nach der Operation normal. Viele Patienten vergleichen den Schmerz mit einer Prellung, oder Muskelkater. Sollten stärkere Schmerzen auftreten, dann bitte ich Dich, dass Du dich umgehend bei uns meldest. Als Schmerzmittel kannst Du Ibuprofen, Mexalen (Paracetamol) oder Parkemed, bzw. Seractil verwenden. Bitte verzichte auf Aspirin oder Thomapyrin.
- Ein Ziehen im Bereich der Rektusraffung vertikal in der Mitte des Bauches ist normal, weswegen Du zu Beginn leicht gebückt gehst. Du kannst dich jedoch in den ersten Tagen nach der OP langsam komplett aufrichten.
- Wir verschreiben Dir nach der Operation sowohl Antibiotikum (Infektionsschutz) für 1 Woche, als auch einen Thromboseschutz (Lovenox) für 3-7 Tage. Solltest Du eine Medikamentenallergie haben, gib uns bitte Bescheid.
- Am 1.-2. Tag nach der Operation werden wir die Wunden kontrollieren. Die Redondrainagen werden am 2. Tag nach der Operation gezogen und ein neuer Verband angelegt, sowie die Kompressionswäsche angezogen. Danach kannst Du die Klinik verlassen.
- Eine weitere Kontrolle findet nach ca. 1 Woche statt. Wenn die Wundverhältnisse sauber sind, kannst Du danach mit Octenisan Waschlotion duschen. Bis dahin sollten die Pflaster nicht nass werden.
- Die Stellen an denen Fett abgesaugt wurde, werden in den ersten 2-3 Tagen sezernieren (Wundflüssigkeit verlieren). Dies ist normal und trägt zur schnelleren Wundheilung bei. Bitte überziehe Dein Bett daheim mit einer alten Bettwäsche und lege Dir Handtücher bereit. Gerne kannst Du bei uns Saugunterlagen für Dein Bett erwerben. Bitte nimm Dir Ersatzkleidung mit, solltest Du unterwegs sein.
- Der Bauchgurt wird nach 2 Tagen gegen eine Kompressionswäsche ausgetauscht. Die Kompressionswäsche solltest Du für 6 Wochen Tag und Nacht tragen. Du kannst sie aber jederzeit zum Waschen und Trocknen ausziehen. In der Zwischenzeit kannst Du auf eine Kompressionswäsche verzichten, oder den Bauchgurt tragen. Gerne stellen wir Dir aber auch eine 2. Wäsche zur Verfügung.
- Wir empfehlen Dir Ruhe in den ersten 5 Tagen nach der OP. Du solltest Dich jeden Tag ein wenig bewegen und kleine Spaziergänge machen. Liegen und Gehen sind ideal. Wenn Du im Büro lange sitzt, ist es ratsam regelmäßig aufzustehen und dich ein wenig zu bewegen um die Lymphe anzuregen.
- Lymphdrainagen ab dem 2. Tag nach der Operation können den Heilungsverlauf beschleunigen. Die Lymphdrainage ist nicht schmerzhaft und kann über unsere Ordination gebucht werden.
- Nach ca. 2 Wochen entfernen wir die Fadenknoten und Du kannst mit der Narbenmassage mit einem silikonhaltigen Narbengel beginnen. Die Narbe sollte 6 Monate vor UV-Strahlung (Sonne und Solarium) durch Abdecken bzw. Sunblocker (SSF 40+) geschützt werden. Für eine besonders schöne Narbenheilung können wir ab der 4. Woche mit einer Laserbehandlung beginnen. Um Faszienverklebungen vorzubeugen, empfehlen wir im Bereich der Fettabsaugung bzw. den Bauchbereich einen Massageroller oder eine Massagekugel zu verwenden und regelmäßig leichte Stretchingübungen durchzuführen.

- Üblicherweise bist Du 1-2 Wochen nach der OP wieder arbeitsfähig (Bürojob). Solltest Du einen handwerklichen Beruf haben (Krankenschwester, Friseurin,...) würden wir 2 Wochen Ruhe empfehlen.
- Blaue Flecken können bis etwa 3-4 Wochen nach der OP sichtbar sein. Wassereinlagerungen und Schwellungen gehen in den ersten Wochen langsam zurück, können aber 6-8 Wochen anhalten.
- Vermeide Hitze (Sauna) und sportliche Aktivität für 6 Wochen. Mit leichtem Sport (walken, radfahren...) kann schon nach 2 Wochen begonnen werden.
- Auch wenn Du schnell wieder gesellschaftsfähig bist, dauert es eine Weile bis der Operationserfolg vollständig sichtbar ist. Über das Endergebnis kannst Du dich 6 Monate nach der Operation in vollen Zügen freuen.